

事 務 連 絡
令和4年3月25日

事 業 主 殿

全国設計事務所健康保険組合

新型コロナウイルスワクチン職域追加接種（3回目）について

謹啓 春分の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件につきましては、令和4年2月25日付事務連絡にて、当組合においても3回目接種を実施する予定である旨、ご案内したところです。

今般、実施の準備が整いましたので、別紙のとおり「新型コロナウイルスワクチン職域追加接種（3回目）実施要領」をご送付いたします。

なお、職域追加接種については1・2回目接種と同様に厳格なワクチン管理を国から求められており、また、ワクチンの供給量や接種会場の確保等の理由により、全ての加入者の皆様へワクチン接種を実施する体制を整えることが難しい状況であります。

諸事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

本件に関する問い合わせ先
全国設計事務所健康保険組合 総務部
担当者：総務部 田中 佐々木 荒川
電 話：03-3404-9545

新型コロナウイルスワクチン職域追加接種（3回目）実施要領

1. 日 時 令和4年6月4日（土）、11日（土）、18日（土）の3日間

接種日	午前の部	午後の部
6月4日（土）	9:30～11:30 (30分単位4区分)	13:00～15:30 (30分単位5区分)
6月11日（土）		
6月18日（土）		

2. 場 所 健保会館（けんぽプラザ） 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-37-9

◆最寄り駅

JR中央・総武線 千駄ヶ谷駅 下車徒歩7分
都営地下鉄大江戸線 国立競技場駅 下車徒歩7分
東京メトロ副都心線 北参道駅 下車徒歩7分

3. 対 象 者 以下の「接種条件」を満たす方

◆接種条件

- ①接種日において18歳以上の方
 - ②接種日において原則として2回目接種完了から6か月以上経過した方
- なお、原則として接種日には、接種券付き予診票か接種券をご持参ください。
また、接種日受付時に2回目接種日のわかるものをご提示ください。

4. 定 員 1,500名

5. 使用ワクチン 武田／モデルナ社ワクチン 0.25ml（初回接種時の半分量）
※別添の「新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書（追加（3回目）接種用）」を必ずお読みください。

6. 費 用 無 料

7. 申 込 方 法 インターネット予約

令和4年4月18日（月）午前10時00分より受付を開始いたします。

以下のQRコードまたは組合ホームページの職域追加接種のご案内画面のリンク先から予約サイトへアクセスしてください。

※予約サイトのログイン方法や操作については、組合ホームページに公開予定の「WEB申込の流れ」を参照ください。



公開予定日：4月11日（月）を予定

※定員になり次第申込受付終了となります。

※ワクチンの供給状況等により日程の変更または中止する場合があります。
その際は組合ホームページ等でお知らせいたします。

8. 持参するもの 接種の当日は以下のものをご持参ください。
- ・新型コロナワクチン接種利用券（バーコード付き）
予約が完了した際に表示される接種利用券を印刷しご持参ください。
なお、スマートフォンに保存したスクリーンショット等の予約完了画面でも対応させていただきます。
 - ・自治体から送付された接種券付き予診票
接種予定日が近くなっても（目安として10日前）接種券が届いていない場合は、市町村へご請求し、取り寄せてください。
 - ・2回目接種日のわかるもの（接種記録表等）
 - ・健康保険証（本人確認書類）
9. 注意事項 以下の「注意事項」にご留意ください。
- ・基礎疾患等の制限はありませんが、かかりつけ医に接種の申込前に職域での追加接種の可否をご確認ください。
 - ・当組合ではファイザー社製のワクチンは選択できません。ファイザー社製をご希望の場合はお住まいの自治体等にお問い合わせください。
 - ・予約時にお手元に接種券が届いていなくても予約は可能ですが、接種当日に接種券がない場合は接種が出来ない場合がございます。
 - ・本件に関するご質問等は「10. 問い合わせ先」あてにご連絡ください。
10. 問い合わせ先 TEL 03-3404-9545 総務部 田中・佐々木・荒川 あて

厳格なワクチン管理を国から求められているため、大規模会場および自治体等との重複予定は行わないでください。

新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (追加 (3 回目) 接種用)

武田/モデルナ社
ワクチン用
(2022年2月)

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンの追加 (3 回目) 接種は 18 歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンは武田/モデルナ社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

本ワクチンの追加接種から 28 日後の中和抗体価は、2 回目の接種から 28 日後の中和抗体価よりも高い値であることが報告されています。

販売名	スパイクバックス筋注 [®]
効能・効果	SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔	1 回 (2 回目の接種が完了してから一定の間隔が経過した後) ※筋肉内に接種
接種対象	18 歳以上 (18 歳未満の人に対する追加接種の有効性・安全性はまだ明らかになっていません。)
接種量	1 回 0.25 mL を 1 回

- 予防接種法に基づく追加接種の間隔は、対象となる方に応じて異なります (少なくとも 6 ヶ月)。お住まいの自治体からのお知らせを確認してください。
- 1 回目や 2 回目の接種に用いたワクチンの種類に関わらず、本ワクチンの接種が可能です。
- 本ワクチンの追加接種を受けても、感染を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種にかかわらず、引き続き、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人 (※1)
 - 重い急性疾患にかかっている人
 - 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症 (※2) の既往歴のある人
 - 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- (※1) 明らかな発熱とは通常 37.5℃ 以上を指します。ただし、37.5℃ を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- (※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。1 回目あるいは 2 回目の接種でこれらの症状が認められた人は、同一のワクチンを用いた追加接種を受けることはできません。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。ただし、かかりつけの産婦人科医に確認していない場合でも、予診医によりワクチン接種が可能と判断された場合は、接種が可能です。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

(うらへ続く)

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

副反応について

- 主な副反応は、注射した部分の痛み（※1）、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。
- (※1) 初回（1回目・2回目）接種では、接種直後よりも翌日に痛みを感じる方が多く、また、接種後1週間程度経ってから、痛みや腫れなどが起きることも報告されています。
- ごく稀ではあるものの、初回接種では、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています（※2）。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
- (※2) 1回目よりも2回目の接種の後に多く、若い方、特に男性に多い傾向が見られます。
- 追加接種では、1回目や2回目の接種と比較して、リンパ節の腫れが多く（20%程度）報告されています。症状がひどかったり長引く場合は、医療機関を受診してください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（武田／モデルナ社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ エラソメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◇ SM-102：ヘプタデカン-9-イル 8-((2-ヒドロキシエチル)(6-オキソ-6-(ウンデシルオキシ)ヘキシル)アミノ)オクタン酸エステル ◇ コレステロール ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ 1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-メチルポリオキシエチレン（PEG2000-DMG） ◇ トロメタモール ◇ トロメタモール塩酸塩 ◇ 氷酢酸 ◇ 酢酸ナトリウム水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。